

Nombre paciente:

NHC:

Fecha RM:

La mayoría de estructuras son valorables en los cortes axiales de las secuencias hiperpotenciadas en T2. Determinadas situaciones requieren la visualización mediante otro tipo de secuencia, lo cual aparece especificado de forma individual

OÍDO DERECHO		Evaluación de Imágenes de RM en patología otológica	OÍDO IZQUIERDO	
SI	NO		SI	NO
Conducto auditivo externo (T1 - Gd, T2)				
☐	☐	¿Existen lesiones ocupantes de espacio?	☐	☐
☐	☐	¿Está engrosada la piel o muestra captación patológica de contraste?	☐	☐
Oído medio (caja timpánica y mastoides)				
☐	☐	¿Existen lesiones ocupantes de espacio?	☐	☐
☐	☐	¿Existe herniación dural (señal de LCR) o tejido cerebral en ático-antro-mastoides? (coronal)	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel del ganglio geniculado?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel del trayecto del nervio facial?	☐	☐
Oído interno				
Cóclea:				
☐	☐	¿Existen alteraciones en cuanto a su tamaño y/o morfología?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteración del modiolos y/o septos interescalares?	☐	☐
☐	☐	¿Hay ausencia de señal de líquido en el interior de la cóclea?	☐	☐
Vestíbulo y canales semicirculares:				
☐	☐	¿Existen alteraciones en cuanto a su tamaño y/o morfología?	☐	☐
☐	☐	¿Hay ausencia de señal de líquido en estas estructuras?	☐	☐
☐	☐	¿Existe dilatación del acueducto coclear?	☐	☐
☐	☐	¿Existe dilatación del acueducto vestibular?	☐	☐
Apex petroso y región petroclival				
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel de los trayectos vertical, horizontal e intracavernoso de la ACI?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel de VVI, golfo de la yugular y/o foramen yugular?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel del cavum de Meckel?	☐	☐
☐	☐	¿Existe ocupación patológica del ápex petroso y/o región petroclival?	☐	☐
Conducto auditivo interno				
☐	☐	¿Existe asimetría de ambos CAIs?	☐	☐
☐	☐	¿Hay lesiones ocupantes de espacio?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones en el trayecto de los nervios facial, coclear, vestibular superior y/o vestibular inferior?	☐	☐
☐	☐	¿Se identifica un trayecto intracanalicular de la AICA?	☐	☐
Angulo pontocerebeloso				
☐	☐	¿Hay lesiones ocupantes de espacio?	☐	☐
☐	☐	¿Se identifican anomalías a nivel del bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo y/o flóculos cerebelosos?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones a nivel del IV ventrículo y/o foramen de Lushka?	☐	☐
☐	☐	¿Existen alteraciones de las arterias: vertebrales, basilar, PICA, AICA, cerebelosa superior?	☐	☐
¿Existen alteraciones en el trayecto de los siguientes pares craneales?				
☐	☐	V y VI	☐	☐
☐	☐	VII y VIII	☐	☐
☐	☐	Pares craneales bajos (IX a XII)	☐	☐